

うつ病の薬による副作用の主なもの

吐き気 むかつき
偏頭痛
のどの渇き
立ちくらみ
便秘
勃起しない・射精しない

統合失調症の薬による副作用の主なもの

【ジストニア】

顔や首が強くこわばる
首が反り返ってしまう
目が上を向いたまま正面を向かない
舌が出たままになってしまう
ろれつがまわらない
体が傾いたり、手足がつっぱる

【アカシジア】

絶えず歩き回る
足を落ち着きなくゆらす
立っているときに足踏みをする
じっと座っていることができない
じっと立っていることができない

【ジスキネジア】

舌鼓を繰り返す 舌を突き出す
口をすぼめる 唇をとがらせる
口をもぐもぐと動かす 歯をくいしばる
まばたきを繰り返す まぶたが開けにくい
指を繰り返し曲げ伸ばしする
腕をねじるような動きをする
体をくねらせる、ねじるような動きをする

黒目がぐるっと上がり、まぶたの裏に隠れる
ゴックンと食べ物を飲み込めない
口がこわばり、うまくしゃべることができない
手がふるえてしまう
体が前かがみになり、小刻みに歩く

錐体外路症状

その他の副作用

体がぶるぶる震えて40度近くの高熱が出る
立ちあがるときに、めまいがする
口の中の唾液が出ない、のどがとても渇く
太る・糖尿病になってしまう
生理不順
乳汁が出る
勃起しない

うつ病の薬による副作用の主なもの

● 偏頭痛



● 吐き気 むかつき



● たちくらみ



● 口やのどが渇くので、多飲になる



● 勃起しない



● 便秘





統合失調症の薬による副作用の主なもの

- 足がムズムズしておちつかない。座ってられない



- 首が反り返ってしまう。目が斜め上を見てしまう。体も傾いてしまう



- 体をくねらせてしまう



- 舌が突き出てしまう



- 腕がねじれるようになってしまう



- 口がもぐもぐ動いてしまう



統合失調症の薬による副作用の主なもの

● 食べ物をゴクンとのみこめない



● 黒目がぐるっと上になり、まぶたの裏にかくれてしまう



● 手が震えてしまう



● ろれつがまわらない、うまく喋ることができない



● からだ全体が固まり小刻みに震える・高熱



● 両手が前に出て、前傾姿勢となり、こきざみに歩く





統合失調症の薬による副作用の主なもの

● 口やのどが渇くので、多飲になる



● たちくらみ、低血圧



● 生理不順



● 体重が増えてしまう



● 勃起しない



● 妊娠・出産をしていないのに乳汁が出る

